AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-4-74 742330

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC
(Tél. 92.28.72)
(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)
Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal
34076 MONTPELLIER-CEDEX
C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

30 Francs
Nouvelle série N° 13

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure
Agronomique de MONTPELLIER

Tél. 63-05-32

Montpellier, le 23 Avril 1974

N O T E : 1

- TORDEUSES DE LA GRAPPE -

Le premier vol d'eudémis est actuellement très important dans les situations chaudes de coteaux bien exposés, notamment à Monpellier - Cavalade où les captures ont atteint trente sept papillons par piège.

La végétation étant assez avancée, les pontes y sont alors abondantes, et nécessitent un traitement insecticide devant être terminé avant la fin du mois d'Avril.

A Baixas, Banyuls des Aspres (Pyrénées-Orientales) Beaucaire, Pont Saint Esprit (Gard) le vol est très faible pour le moment.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles,

G. BERNON

Tirage du 23 Avril 1974 - 2 121 exemplaires.

Imprimerie de la Station du Languedoc - Directeur-gérant : L. Bouyx

P99

(suite)

FONGICIDES UTILISABLES POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES DES CEREALES EN VEGETATION (suite)

Carbendazim + Manèbe	BAVISTINE M B.A.S.F. SANDOZ	6 % de carbendazim 50 % de manèbe	5 kg/ha	Piétin-verse, fusarioses, septorioses, Oïdium et rouilles
Soufre	MICROTHIOL SPECIAL R.S.R.	80 % m.a.	10 kg/ha	Oïdium. Effets secondaires sur septorioses, fusarioses et rouilles.
Soufre + manèbe	SILODOR R.S.R.	60 % + 15 %	14 kg/ha	Oïdium et rouilles. Effets secondaires sur septorioses et fusarioses
Soufre + manèbe	DARYL M SEDAGRI	64 % + 16 %	12,5 kg/ha	Oïdium et rouilles. Effets secondaires sur septorioses et fusarioses
Soufre + manèbe	TRIAL CIBA-GEIGY	46,5 % + 15,5 %	17 kg/ha	Oïdium et rouilles. Effets secondaires sur septorioses et fusarioses
Soufre + Thirane	DARYL 96 SEDAGRI	64 % + 20 %	12,5 kg/ha	Oïdium et rouilles. Effets secondaires sur septorioses et fusarioses.
Dinocap + mancozèbe	MANCOKAR R. & H.	8,33 % + 53,3 % m.a.	3 kg/ha	Oïdium et rouilles. Effets secondaires sur septorioses et fusarioses.